

Paciente: **ANTONIA LIMA DE SOUSA**
Sexo: **F**
Idade: **72Y**
Solicitante: **MARIA ALICE V SORANZ**

Prontuário: **178798**
Data: **28/03/2023**

DOPPLER COLORIDO VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES


- Veias femorais comuns, femorais superficiais, femorais profundas, poplíteas e tibiais com trajetos habituais e calibres preservados bilateralmente.

Sistema venoso superficial e perforante:

- Veias safenas magnas e parvas pérvias e suficientes, com compressibilidade preservada e calibre normal.
- O calibre da safena magna direita é de 0,8 cm na crossa, 0,1 cm no terço distal da coxa e 0,1 cm no terço distal da perna.
- O calibre da safena magna esquerda é de 0,8 cm na crossa, 0,1 cm no terço distal da coxa e 0,1 cm no terço distal da perna.
- Ausência de veias perforantes insuficientes.
- Presença de refluxo em ambas as safenas magnas, das crossas até os tornozelos.
- Vênulas varicosas subcutâneas esparsas pelos membros inferiores, predominando nas faces posteriores e mediais das coxas, joelhos e pernas, (veias reticulares e/ou telangiectasias), conforme achados clínicos.
- Veias ectasias e tortuosas não-tributárias (compartimentalizadas) esparsas pelo membro inferior bilateral, predominando nas faces posteriores e mediais das coxas/joelhos e pernas, conforme achados clínicos (colaterais).

Sistema venoso profundo:

- As veias profundas avaliadas conservam compressibilidade normal e apresentam fluxo de padrão monofásico ao estudo com Doppler, variável com a respiração.
- Não foi observado refluxo significativo às manobras compressivas e respiratórias nas veias do sistema venoso profundo.



Gustavo Garcia
Médico(a) Radiologista
CRM: 108560 SC

Opinião:

- Veias safenas magnas insuficientes.

- Vênulas varicosas subcutâneas esparsas pelos membros inferiores, predominando nas faces posteriores e mediais das coxas, joelhos e pernas, (veias reticulares e/ou telangiectasias), conforme achados clínicos.

- Veias ectasias e tortuosas não-tributárias (compartimentalizadas) esparsas pelo membro inferior bilateral, predominando nas faces posteriores e mediais das coxas joelhos e pernas, conforme achados clínicos (colaterais).

Digitadora: Fernanda.



Gustavo Garcia
Médico(a) Radiologista
CRM: 108560 SC

Paciente: **ANTONIA LIMA DE SOUSA**
Sexo: **F**
Idade: **72Y**
Solicitante:

Prontuário: **178798**
Data: **28/03/2023**

DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES

Realizada avaliação das artérias femorais comuns, femorais profundas, femorais superficiais, poplíteas, tibiais anteriores, tibiais posteriores e fibulares bilateralmente.

Placas ateromatosas calcificadas distribuídas por todos os segmentos avaliados.

Todas as artérias analisadas apresentam fluxo de padrão trifásico habitual e com velocidades preservadas.

Não há dilatações aneurismáticas detectáveis.

Opinião:

- Sinais de ateromatose difusa sem estenoses e/ou repercussões hemodinâmicas significativas.

Digitadora: Fernanda.



Gustavo Garcia
Médico(a) Radiologista
CRM: 108560 SC

