

AME CLINIC

Paciente: Jucelino Tovaes De Lima

Data de nascimento: 06/03/1957

Data do exame: 01/08/2024

Médico Solicitante: Dra. Vivian A. Antunes

DUPLEX SCAN VENOSO DE MEMBROS INFERIORES

Exame realizado em aparelho **SIEMENS ACUSON**, com transdutor linear multifrequencial, sob condições de temperatura não extremas; a perviedade das veias foi analisada com o paciente em posição de céfalo-active e o refluxo com paciente em posição ortostática, utilizando manobras de aceleração de fluxo com compressão proximal e distal e manobras de Valsalva.

MEMBRO INFERIOR DIREITO:

SISTEMA VENOSO PROFUNDO

Visibilizadas veias femorais comuns, femoral superficial, femoral profunda, poplítea, tibiais anterior e posterior e fibulares em todo o seu trajeto, mostrando-se todas compressíveis, sem conteúdo intraluminal, pérvias, com fluxo fásico com a respiração e sem sinais de refluxo patológico em nenhum trecho, bem como sem sinais de trombose venosa.

SISTEMA VENOSO SUPERFICIAL

Visibilizada junção safeno-femoral com diâmetro de 4,86 mm, pérvia e sem sinais de refluxo patológico.

Visibilizada veia safena interna em todo o seu trajeto, mostrando-se compressível, sem conteúdo intraluminal, pérvia, fásica com a respiração, sem sinais de refluxo patológico em nenhum trecho e diâmetros medindo:

Coxa proximal: 3,53 mm

Coxa média: 3,79 mm

Joelho: 3,53 mm


Perna: 2,42 mm

Tornozelo: 2,30 mm

Não visibilizadas veias perfurantes insuficientes.

Poucas varizes em face medial da perna.

Visibilizada veia safena externa em todo o seu trajeto, com diâmetro medindo 3,32 mm proximal e 3,0 mm distal e mostrando-se compressível, sem conteúdo intraluminal, pérvia, sem sinais de refluxo patológico em toda sua extensão e terminando proximalmente em meio à musculatura da coxa.



AME CLINIC

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO:

SISTEMA VENOSO PROFUNDO

Visibilizadas veias femorais comuns, femoral superficial, femoral profunda, poplítea, tibiais anterior e posterior e fibulares em todo o seu trajeto, mostrando-se todas compressíveis, sem conteúdo intraluminal, pérvias, com fluxo fásico com a respiração e sem sinais de refluxo patológico em nenhum trecho, bem como sem sinais de trombose venosa.

SISTEMA VENOSO SUPERFICIAL

Visibilizada junção safeno-femoral com diâmetro de 4,98 mm, pérvia e sem sinais de refluxo patológico.

Visibilizada veia safena interna em todo o seu trajeto, mostrando-se compressível, sem conteúdo intraluminal, pérvia, fásica com a respiração, sem sinais de refluxo patológico em nenhum trecho e diâmetros medindo:

Coxa proximal: 3,75 mm

Coxa média: 3,0 mm

Joelho: 2,49 mm


Perna: 2,32 mm

Tornozelo: 2,0 mm

Não visibilizadas veias perfurantes insuficientes.

Varizes em face medial e anterior da perna.

Visibilizada veia safena externa em todo o seu trajeto, com diâmetro medindo 2,21 mm proximal e 2,0 mm distal e mostrando-se compressível, sem conteúdo intraluminal, pérvia, sem sinais de refluxo patológico em toda sua extensão e terminando proximalmente em meio à musculatura da coxa.



AME CLINIC

IMPRESSÃO DIAGNOSTICA:

- Sistema venoso profundo dos membros inferiores sem alteração.
- Veia safena interna e externa dos membros inferiores sem alteração.
- Varizes.

Dr. Daniel Bartalotti

CRM. 116.672

NOME: JUCELINO TOVARES DE LIMA
PACIENTE: 157064 CPF: 002.921.148-42
IDADE: 68 A 10 M SEXO: M
MEDICO SOL: MEDICO NAO CADASTRADO

DOCUMENTO: 96332748
DATA: 30/01/2026



ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL

Fígado com dimensões normais, contornos regulares, bordas finas e ecotextura homogênea. Veia porta e veias hepáticas sem alterações.

Vesícula biliar com forma e dimensões normais, paredes finas e regulares, apresentando conteúdo anecogênico sem imagens calculosas.

Não há dilatação das vias biliares intra ou extra-hepáticas.

Pâncreas de dimensões normais, contornos regulares e ecotextura homogênea. Não há dilatação do ducto pancreático.

Baço com dimensões normais, contornos regulares e ecotextura homogênea.

Aorta com paredes irregulares, apresentando dilatação aneurismática fusiforme infrarrenal com calibre máximo de 3,1 cm e extensão de 5,0 cm, com trombo parietal.


Ausência de linfonodomegalias retroperitoneais detectáveis.

Rins tópicos com dimensões normais, contornos regulares e ecotextura habitual. Não há evidências de imagens calculosas calicinais. Não há dilatação do sistema coletor.

Bexiga com boa repleção, paredes finas e regulares, conteúdo anecogênico.

Ausência de líquido livre.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:



DR Felipe Augusto Tassinari
CRM1 644485 SP

Assinado em 30/12/1899GMT (Brasília Time)

www.topimagemsorocaba.com.br